

Société Mycologique du Sedanais

Compte-rendu de la sortie du samedi 26 septembre 2026

Lieu : Pouru-aux-Bois - La forêt du Mortehan

Météo : Temps ensoleillé - Température 25 degrés - Sol sec, sauf près de l'étang

8 personnes présentes, dont 7 de la Société Mycologique du Sedanais

25 espèces différentes identifiées



La liste des espèces récoltées suit ces quelques photos





Liste des 26 espèces identifiées au cours de la sortie

	<i>Nom officiel</i>	<i>Autres appellations</i>	<i>Nom français</i>	<i>Commentaires</i>	<i>Comestibilité</i>	<i>Etymologie des espèces</i>
1	Calocera viscosa		Calocère visqueuse	Sur souche de conifère	Toxique	viscum = la glu
2	Cortinarius paleaceus	Cortinarius flexipes, paleiferus, Cortinarius hemitrichus	Cortinaire semi poilu	Hygrophane, couvert de mèches blanches caduques - Chapeau à voile pailleté, sans odeur - Pied couvert par un voile blanc copieux - Sous bouleaux et conifères	Comestible sans intérêt	hemi= à demi, trix=poil
3	Fomes fomentarius		Amadouvier	En forme de sabot, très épais, pores fins, chair à consistance de liège, saveur un peu amère.	Non comestible	fomenta = aliments pour le feu
4	Fomitopsis pinicola	Ungulina marginata	Amadouvier des pins	A marge orangée	Non comestible	pinus = le pin
5	Hebeloma laterinum	Hebeloma edurum	Hébélome dur	Marge crénelée, odeur de chocolat	Toxique	later = brique séchée (ressemblant à)
6	Hygrophoropsis aurantiaca		Fausse girolle	Chapeau et lames orangé, lames fourchues non anastomosées	Comestible sans intérêt	aurantius = orangé
7	Hypholoma fasciculare		Hypholome en touffes	Lames verdâtres et chair amère	Toxique	fascis = le faisceau, le fagot
8	Hypholoma lateritium	Hypholoma sublateritium	Hypholome couleur de briques	Lames non verdâtres - Chapeau de couleur brique	Toxique	lateritius = de brique (couleur)
9	Hypoxylon fragiforme		Hypoxyle en forme de fraise	Carpophores globuleux verruqueux distincts	Non comestible	fragum = la fraise
10	Imleria badia	Boletus badius - Xerocomus badius	Bolet bai	Bolet brun-bai (tubes verdissant au toucher)	Comestible avec modération	badius = bai
11	Laccaria affinis	Laccaria laccata	Laccaire laqué	Spores rondes	Comestible avec modération	affinis = voisin (de laqué)
12	Lactarius tabidus	Lactarius theiogalus	Lactaire dépérissant	Chapeau crème orangé - Lait blanc jaunissant lentement sur lames, plus rapidement sur le mouchoir - Mamelon ridulé - Surtout sous bouleaux dans les sphaignes	Comestible sans intérêt	tabere = se liquéfier, dépérissant
13	Leccinum variicolor		Bolet rude	Chapeau marbré de noirâtre.Stipe taché de bleu à la base	Comestible avec modération	varius = varié
14	Leccinum brunneogriseolum	Leccinum cyaneobasileucum	Bolet rude gris brun Bolet rude à base bleue	Stipe à squames blanches ou crème fonçant avec l'âge pour devenir brunâtres. La base est souvent tâchée de vert-bleu à bleu , visible parfois seulement après la coupe. Peu fréquent Sous feuillus (bouleaux)	Comestible	brunneus = brun griseus = gris
15	Phlebia tremellosa	Merulius tremellosus	Mérule tremblante	Chapeau mou en petites colonnes imbriquées et étagées, marge ondulée- Hyménium réticulé, sur bois mort	Non comestible	tremô = trembler

16	Mycena galericulata		Mycène en casque	Chapeau gris beige à gris brun - Un peu mamelonné - Lames crème +/- roses ,peu serrées +/- interveinées à leur base - Odeur et goût de farine - en touffe sur souche	Comestible avec modération	galericulum = calotte
17	Mycetinis alliaceus	Marasmius alliaceus	Marasme à odeur d'ail	Pied noir tenace - Odeur forte d'ail	Comestible sans intérêt	allium = l'ail
18	Pluteus semibulbosus	Pluteus boudieri	Plutée de Boudier	Sur bois mort en décomposition - Odeur acidulée	Sans intérêt	Bulbus = en forme de bulbe
19	Psathyrella laevis			Petit champignon de la famille des Psathyrellaceae, qui pousse en touffes sur le bois mort ou les souches de feuillus	Sans intérêt	laevis = lisse
20	Psathyrella maculata	Psathyrelle tâchée	Psathyrelle tâchée	Sur souches ou sur terre mêlée de bois enfoui - Sous feuillus - Assez rare	Sans intérêt	maculatus = tacheté ou souillé
21	Russula betularum		Russule des bouleaux	Petite espèce rose sous bouleaux, chair fragile blanche, sur sol humide, fer rose peu intense, gaïac faible et lent	Toxique	betula = bouleau
22	Russula claroflava	Russula ochroleuca var. claroflava	Russule jaune noircissante	Dans les forêts humides et tourbeuses, sous bouleau, sur sol non calcaire. Cette russule peut être confondue lors d'un examen superficiel avec Russula Ochroleuca, qui est bien plus fréquente et qui peut pousser dans les mêmes stations, mais elle possède une couleur moins vive	Comestible sans intérêt	clarus = claire flavus = jaune
23	Russula pumila		Russule des aulnaies Russule modeste	Sous feuillus et aulnes - Saveur douce - Odeur faible	Sans intérêt	pumilus = de petite taille
24	Scleroderma verrucosum		Scléroderme verruqueux	Intérieur violacé noirâtre, péridium fin à verrues plates et irrégulières, stipe très développé	Toxique	verruca = verrue
25	Tricholoma fulvum		Tricholome jaune et brun	Chapeau visqueux brun orangé à marge jaune cannelée - Lames et chair du pied jaunes - Odeur de farine - Surtout sous bouleaux et peupliers	Toxique	fulvus = fauve
26	Orbilbia curvatispora			Grégaire (= espèces qui croissent en touffe) - Peu fréquent	Sans intérêt	curvatispora = à spores courbées

A cette liste, il convient d'ajouter 5 champignons dont le genre a pu être déterminé mais pas l'espèce : Inocybe, Pluteus, Laccaria, Tubaria et Hemimycena

Prochaine sortie : suite à l'annulation de notre Petit Salon du Champignon, initialement prévu du 3 au 5 octobre à Pure, une sortie est proposée le samedi 3 octobre à 14:00 au Bannet à Givonne.

Lieu de rendez-vous : Parking du centre équestre de l'Etier Ardennais

Plus de renseignements : <https://sms-myco.e-monsite.com/agenda/>