

Société Mycologique du Sedanais

Compte-rendu de la sortie du samedi 29 août 2026

Lieu : le bois de Raucourt (Forêt syndicale de Raucourt - Haraucourt)

Météo : Temps nuageux avec averses et éclaircies - Température 19 degrés - Sol humide

8 personnes présentes, dont 7 de la **Société Mycologique du Sedanais**

Une bonne trentaine d'espèces différentes récoltées **dont 29 identifiées**



La liste des espèces récoltées suit ces quelques photos







Liste des espèces récoltées au cours de la sortie

	Nom officiel	Autres appellations	Nom français	Commentaires	Comestibilité	Etymologie des espèces
1	Artomyces pyxidatus	Clavicornona pyxidata	Clavaire couronnée	Clavaire blanc-ochracé sur bois pourri	Comestible sans intérêt	puxis = la petite boîte
2	Calocera cornea		Calocère cornée	Petit, jaune, sur bois	Non comestible	cornu = la corne
3	Clitopilus prunulus		Meunier	Chapeau blanc mat grisâtre - Chair blanche très fragile - Lames blanches puis roses très décurrentes, odeur de farine	Comestible avec modération	prunum = la prune
4	Collybiopsis peronata	Collybia peronata	Collybie guêtrée	Odeur de vinaigre - Base poilue	A rejeter	peroratus = guêtré
5	Crepidotus applanatus		Crépidotus aplani	Cuticule non séparable	Comestible sans intérêt	applanare = aplanir
6	Cyathus striatus		Cyathe strié	Petit réceptacle à intérieur strié. Péridioles grisâtres.	Non comestible	stratus = strié

7	Fomes fomentarius		Amadouvier	En forme de sabot, très épais, pores fins, chair à consistance de liège, saveur un peu amère.	Non comestible	fomenta = aliments pour le feu
8	Fomitopsis betulina	Piptoporus betulinus	Polypore du bouleau	Charnu, coriace, brun grisâtre à café au lait, pores fins, sur bouleaux mort ou vivant	Comestible sans intérêt	betula = bouleau
9	Gymnopilus penetrans		Flammule pénétrante	Chapeau fibrilleux soyeux - Lames jaunes puis rouille - Sporée rouille orange - Cortine souvent persistante formant une zone annulaire - Sur bois mort, surtout de conifère	A rejeter	penetrater = pénétrer dans
10	Gymnopus dryophilus	Collybia dryophila	Collybie des arbres	Collybie des feuilles	Comestible sans intérêt	drus = le chêne / philos = l'ami
11	Infundibulicybe gibba	Clitocybe gibba	Clitocybe en entonnoir	Mamelonné puis déprimé, lames très décurrentes	Comestible avec modération	gibbus = convexe
12	Lacrymaria lacrymabunda	Psathyrella lacrymabunda, Lacrymaria velutina	Lacrimaire velouté	Lacrimaire velouté	Comestible sans intérêt	lacryma = larme / abundus = abondant
13	Marasmiellus ramealis	Collybiopsis ramealis	Marasme des rameaux	Marasme des brindilles	Comestible sans intérêt	rameus = de branche sèche
14	Marasmius rotula		Marasme petite roue	Présence d'un collarium	Comestible sans intérêt	rota = la roue
15	Mycena erubescens		Mycène amère	Seule Mycène à posséder une chair aussi amère	Sans intérêt	erubescens = devenir rouge
16	Mycena stylobates		Mycène à disque basal	Disque blanc strié et cilié à la base du pied	Comestible sans intérêt	stylobates = base d'une colonne, socle
17	Mycetinis scorodonius	Marasmius scorodonius	Marasme alliacé à pied brillant	Stipe brun rougeâtre, odeur d'ail	Comestible sans intérêt	skorodon = ail
18	Picipes badius	Polyporus badius- Polyporus durus	Polypore bai	Pied central à base noire	Non comestible	durus = dur
19	Pleurotus pulmonarius		Pleurote pulmonaire	Chapeau plat ou mince - Beige pâle ou blanchâtre - Odeur anisée (l'espèce "porrigens" toxique a une odeur d'amande amère)	Comestible sans intérêt	pulmo = poumon

20	Pluteus mammifer		Plutée mammifère	Pluteus mammifer est une espèce rare de champignons basidiomycètes de la famille des Pluteaceae et du genre Pluteus, décrite par le mycologue français Henri Romagnesi en 1979. Chapeau de couleur brune lisse, Lames libres de couleur claire, Pied avec des nuances de brun de jaune et de vert,	Sans intérêt	du latin mamma = mamelle
21	Polyporus tuberaster	Polyporus forquignonii	Polypore à sclérote	Pied central, pores larges décurrents, odeur anisée	Non comestible	tuber = truffe / aster = faux
22	Psathyrella candolleana	Candolleomyces leucotephrus	Psathyrelle de De Candolle	Stipe strié sous les lames	Comestible sans intérêt	de De Candolle
23	Rhytisma acerinum		La tache goudronneuse	Taches noires sur feuilles d'érable	Non comestible	acer = érable (sur feuilles d'érables)
24	Russula risigallina	Russula vitellina-Russula acetolens	Russule jaune	Chapeau visqueux, collant, jaune - Lames jaune-orangé (test du baiser) - Odeur vinaigrée - Sous feuillus	Comestible sans intérêt	luteus = jaune
25	Stereum subtomentosum		Stérée presque soyeuse	Hyménium lisse - face supérieure jaunâtre à brun pâle zonée, face inférieure jaunissant au toucher	Non comestible	sub = presque / tomentum = sert à rembourrer
26	Trametes gibbosa		Tramète bossue	Surface bosselée souvent verdie par les algues, pores allongés radialement	Non comestible	gibbus = bosse
27	Trametes hirsuta		Tramère hirsute	Chapeaux imbriqués, plats et minces. poilue	Non comestible	hirsutus = hérissé
28	Trametes versicolor	Coriolus versicolor	Tramète versicolore	Chapeaux imbriqués, plats et minces, zones concentriques de couleurs très variées	Non comestible	vertere = changer / color = couleur
29	Xylaria polymorpha		Xylaire polymorphe	Carpophores noirs charnus, en masse irrégulière, en touffes, une coupe permet de voir les petites loges noires des spores (périthèces)	Non comestible	poly = nombreux / morphê = forme
... à cette liste il convient d'ajouter quelques russules, une mycène et un plutée dont l'espèce n'a pas pu être identifiée						

Prochaine sortie le samedi 12 septembre 2026 de 14:00 à 17:30 : PURE

Lieu de rendez-vous : Parking de la pharmacie - 5, route de Messempré - 08110 PURE

Plus de renseignements : <https://sms-myco.e-monsite.com/agenda/>