

[Retour](#)

Photos en fin de liste

Lieu : 55 Stenay

Conditions climatiques : Ensoleillé

Personnes présentes : 10 personnes de la SMS (installation, identifications ou simple visite)- Environ 250 visiteurs

147 Espèces identifiées

Les appellations officielles à ce jour sont en rouge

Genre	espèce	Autres appellations	Nom français	Commentaires
Agaricus	campestris		Rosé des prés	Pied atténué à la base, arête des lames concolore, anneau mal formé et vite disparu
Agaricus	sylvaticus		Psallote des bois	Chapeaux avec des squames, chair rougissante
Agaricus	sylvicola		Agaric silvicole	Sous conifères (jaunissant) sans squames, odeur d'anis ou d'amande amère
Aleuria	aurantia		Pézize orangée	Grandes coupes à chair cassante, pied absent, sur terre nue
Amanita	citrina		Amanite citrine	Bulbe marginé - Odeur de rave
Amanita	citrina f. alba	Amanita citrina	Amanite citrine blanche	Bulbe marginé - Odeur de rave - forme blanche
Amanita	muscaria		Amanite tue-mouches	Rouge à pustules blanches, marge striée
Amanita	pantherina		Amanite panthère	Pustules blanc pur, marge striée, bulbe orné de bracelets hélicoïdaux
Amanita	phalloides		Amanite phalloïde	Lames blanches libres + anneau + volve = MORTEL
Amanita	rubescens		Amanite rougissante	Anneau strié, volve nulle. Chair blanche rougissant lentement à l'air
Amanita	vaginata		Amanite vaginée	Pas d'anneau, une volve engainante blanchâtre
Boletus	edulis		Cèpe de Bordeaux	Brun +/- sombre, marge plus claire, réseau concolore sur le haut du stipe
Boletus	erythropus	Neoboletus erythropus	Bolet à pied rouge	Pores rouges, ponctuations sur le pied, chair bleussant rapidement
Boletus	impolitus	Hemileccinum impolitus	Bolet dépoli	Brun ochracé - tubes jaunes non bleussant - Odeur d'iode à la base du pied
Boletus	satanas	Rubroboletus satanas	Bolet Satan	Chapeau blanc, pores et pied rouges, chair bleuit lentement
Calocera	viscosa		Calocère visqueuse	Sur souche de conifère
Calvatia	excipuliformis	Lycoperdon excipuliformis	Calvatie en coupe	Gros stipe bien marqué

Chalciporus	piperatus		Bolet poivré	Bolet poivré (pores bruns, chair poivrée)
Chlorophyllum	brunneum	Macrolepiota venenata, rhacodes var. bohémica, rhacodes var. hortensis	Lépiote vénéneuse	Excoriation en étoile, anneau simple coulissant, chair rosissant à la coupe
Chlorophyllum	rhacodes	Macrolepiota rhacodes	Lépiote déguenillée	Chair devenant rapidement orange à la coupe
Clavicornia	pyxidata	Artomyces pyxidatus	Clavaire couronnée	Clavaire blanc-ochracé sur bois pourri
Clitocybe	gibba	Clitocybe infundibuliformis - Infundibulicybe gibba	Clitocybe en entonnoir	Mamelonné puis déprimé, lames très décurrentes
Clitocybe	odora		Clitocybe odorant	+/- vert palissant - odeur d'anis
Clitopilus	prunulus		Meunier	Meunier (lames roses décurrentes, odeur de farine)
Collybia	butyracea	Rhodocollybia butyracea	Collybie beurrée	A le "toucher du beurre"
Collybia	confluens	Collybiopsis confluens	Collybie confluite	En touffes compactes. Lames très serrées, denticulées.
Collybia	dryophila	Gymnopus dryophilus	Collybie des arbres	Collybie des feuilles
Collybia	fusipes	Gymnopus fusipes	Collybie à pied en fuseau	Pied en fuseau - Sur souches
Collybia	maculata	Rhodocollybia maculata	Collybie maculée	Tachetée, lames denticulées très serrées, saveur amère
Collybia	peronata	Marasmius urens, peronatus, Collybiopsis peronata	Collybie guêtrée	Odeur de vinaigre - Base poilue
Coprinus	atramentarius	Coprinopsis atramentaria	Coprin noir d'encre	Grisâtre, en cloche
Coprinus	comatus		Coprin chevelu	Ovoïde allongé blanc, pelouses, prairies, bords de route
Coprinus	micaceus	Coprinellus micaceus	Coprin micacé	Centre saupoudré de flocons blancs
Coprinus	picaceus	Coprinopsis picacea	Coprin pie	Noir parsemé de pustules blanches
Cortinarius	purpurascens	Cortinarius eumarginatus, Thaxterogaster purpurascens	Cortinaire purpurescent	Gris lilas, gris bleuté ou gris brun au centre. Chair se tachant vite de rose violacé à l'air
Cortinarius	trivialis	Cortinarius collinitus, muscigenus	Cortinaire commun	Pied recouvert de bracelets étagés
Craterellus	cornucopioides		Trompette des morts	Trompette des morts, hyménium vaguement veiné, stipe creux.
Crepidotus	variabilis		Crépidote variable	Souvent attaché "par le dos"
Daedaleopsis	tricolor	Daedaleopsis confragosa var. tricolor	Tramète rude	Pores en fausses lames
Echinoderma	asperum	Cystolepiota aspera, Lepiota acutesquamosa	Lépiote à lames fourchues	Écailles pointues brunes
Entoloma	lividum	Entoloma sinuatum	Entolome livide	Lames roses émarginées. odeur de farine. Très toxique
Entoloma	rhodopolium f. nidorosum	Entoloma nidorosum, Entoloma rhodopolium	Entolome à odeur de nitre	Lames roses émarginées. odeur de chlore
Fistulina	hepatica		Langue de boeuf	Pores crème, chapeau brun-rouge
Fomes	fomentarius		Amadouvier	En forme de sabot, très épais, pores fins, chair à consistance de liège, saveur un peu amère.
Fomitopsis	pinicola	Ungulina marginata	Amadouvier des pins	A marge orangée
Galerina	marginata		Galère marginée	Pas d'armille floconneuse, odeur et saveur de farine - MORTEL
Geastrum	triplex		Géastre à trois enveloppes	Charnu, à lanières épaisses

Gymnopilus	penetrans		Flammule pénétrante	Sur bois mort - Pied +/- lisse
Hebeloma	crustuliniforme		Hébélome croûte de pain	Odeur de rave. Saveur amère. Pas de mèche
Hebeloma	leucosarx		Hébélome à chair blanche	Petit hébélome à chair blanche, odeur rave + chocolat
Hebeloma	radicosum		Hébélome radicant	Pied radicant. Odeur de frangipane
Hydnum	rufescens		Hydne roussissant	Pied de mouton roux à aiguillons non décurrents
Hygrophoropsis	aurantiaca		Fausse girofle	Chapeau et lames orangé, lames fourchues non anastomosées
Hygrophorus	eburneus		Hygrophore blanc ivoire	Odeur de peau de mandarine
Hypholoma	fasciculare		Hypholome en touffes	Lames verdâtres et chair amère
Hypholoma	lateritium	Hypholoma sublateritium	Hypholome couleur de briques	Lames non verdâtres - Chapeau de couleur brique
Inocybe	adaequata	Inocybe jurana, Inosperma adaequatum	Inocybe du Jura	Saveur douce, odeur aromatique - Stipe fibrilleux blanc rosé - Sous feuillus sur sol calcaire
Inocybe	geophylla		Inocybe à lames terreuses	Mamelonné blanc à disque tardivement ochracé, odeur spermatique
Inocybe	geophylla var. lilacina	Inocybe geophylla	Inocybe à lames terreuses	"geophylla" lilacin
Inocybe	maculata	Inosperma maculatum	Inocybe maculé	Stipe lavé de roux d'un côté - Taches de voile sur le sommet
Kuehneromyces	mutabilis	Pholiota mutabilis	Pholiote changeante	Chapeau brun cannelle très hygrophane, armille floconneuse jusqu'à une zone annulaire membraneuse, en touffes sur souche
Laccaria	affinis	Laccaria laccata	Laccaire laqué	Spores rondes
Laccaria	amethystina		Laccaire améthyste	Entièrement bleu-améthyste
Laccaria	proxima	Laccaria laccata var. moelleri	Laccaire de Moeller	Laccaire laqué plus trapu
Lacrymaria	lacrymabunda	Psathyrella lacrymabunda, Lacrymaria velutina	Lacrimaire velouté	Lacrimaire velouté
Lactarius	acerrimus		Lactaire très âcre	Chapeau zoné, chair âcre
Lactarius	blennius		Lactaire muqueux	Très visqueux, zoné de brun violacé
Lactarius	flavidus		Lactaire jaune à lait violet	Crème jaunâtre teinté de jaune citron pâle, chair blanche devenant violette à la coupe, lait blanc séchant en violacé sur les lames, chair et lait un peu amère ou piquante.
Lactarius	fluens		Lactaire coulant	Chapeau zoné - lait blanc abondant
Lactarius	fuliginosus		Lactaire enfumé	Brun-gris velouté. Rosâtre vif aux blessures
Lactarius	fulvissimus		Lactaire fauve orangé	Lames crème à orangé, lait blanc immuable, saveur douce puis un peu piquante, odeur de caoutchouc
Lactarius	quietus		Lactaire tranquille	zoné de plages givrées
Lactarius	torminosus		Lactaire à colique	Zoné, laineux, sous bouleaux
Lactarius	turpis	Lactarius plumbeus, necator	Lactaire plombé	Lactaire plombé
Lactarius	uvidus		Lactaire humide	Lait devenant violet, chair violacée à la coupe.

Lactarius	vellereus	Lactifluus vellereus	Lactaire velouté	Lait blanc un peu âcre, réaction nulle à la potasse. Lames espacées,
Laetiporus	sulphureus		Polypore soufré	Le polypore soufré (jaune à orange)
Langermannia	gigantea	Calvatia gigantea	Vesse de loup géante	Vesse de loup géante des prés
Leccinum	aurantiacum		Bolet orangé	Bolet orangé (sous bouleaux)
Leccinum	carpini	Leccinellum pseudoscabrum	Bolet rude	Sous charmes - Chair rosissante puis noircissante
Leccinum	crocipodium	Leccinellum crocipodium	Bolet à pied jaune	Pied jaune (comme son nom l'indique)
Leccinum	scabrum		Bolet rude	Bolet "rude" sous bouleaux, Fe gris à gris-bleu)
Lepiota	clypeolaria		Lépiote en bouclier	Calotte bien délimitée - Odeur faible
Lepiota	ochraceosulfurescens	Lepiota clypeolaria	Lépiote ochracée jaunissante	Comme "clypeolaria" mais centre moins limité et odeur de caoutchouc
Lepista	flaccida	Paralepista flaccida	Clitocybe flasque	Ocre-orangé, lames très décurrentes, sous feuillus
Leucoagaricus	leucothites	Lepiota pudica, naucina	Lépiote pudique	Lames blanches à rosées, anneau mobile
Lycoperdon	perlatum		Vesse de loup perlée	Boule molle blanche avec de fins aiguillons coniques à base ronde, petit mamelon brun ensuite percé d'un petit trou rond, pas de diaphragme, sur le sol
Lyophyllum	decastes	Lyophyllum aggregatum	Tricholome agrégé	Ocre-brunâtre, en touffes
Macrolepiota	mastoidea		Lépiote mamelonnée	Moins élancé et plus charnu que "gracilentia"
Macrolepiota	procera		Lépiote élevée	Mamelonné à calotte brune - Squames circulaires
Marasmius	alliaceus	Mycetinis alliaceus	Marasme à odeur d'ail	Pied noir tenace - Odeur forte d'ail
Marasmius	oreades		Marasme des Oréades	En cercles dans les prés - Stipe tenace
Megacollybia	platyphylla		Collybie à feuilletts épais	Grands filaments mycéliens en "racinelles"
Meripilus	giganteus		Polypore géant	Pores fins et noircissant
Morganella	pyriformis	Lycoperdon pyriforme, Apioperdon pyriforme	Vesse de loup en forme de poire	En forme de poire, sur bois mort
Mycena	galericulata		Mycène en casque	Un peu mamelonné, lames peu serrées +/- interveinées, odeur et goût de farine, en touffe sur souche
Mycena	haematopus		Mycène à lait rouge	Lait rouge dans le stipe . Généralement lignicole
Mycena	inclinata		Mycène inclinée	Marge striée - pied rougeâtre - saveur et odeur de bougie
Mycena	pelianthina		Mycène à arête violette	Bleu violacé, arête des lames brune, odeur de rave
Mycena	pura	Prunulus purus	Mycène pure	Bleu violacé - Lames non bordées, odeur de rave
Mycena	rosea	Mycena pura var. rosea	Mycène rose	Rose - Lames non bordées, odeur de rave
Omphalotus	illudens	Omphalotus olearius var. illudens	Pleurote de l'olivier	Orangé vif, lames fines décurrentes non détachables
Oudemansiella	mucida	Mucidula mucida	Mucidule visqueuse	Blanc et visqueux, sur hêtre mort
Panellus	stipticus		Panelle styptique	Chair ochracée. Saveur âpre, styptique

Paxillus	involutus		Paxille enroulé	Brun jaune, velouté, lames décurrentes anastomosées près du pied, pied souvent excentré de la couleur du chapeau, lames séparables du chapeau
Peziza	badia	Legaliana badia	Pézize baie	Coupe irrégulière ondulée, hyménium brun sombre, à reflets olive, face extérieure brun rougeâtre finement granuleuse, sur terre nue
Phaeolus	schweinitzii		Phéole de Schweinitz	Irrégulièrement circulaire, bosselé feutré, brun foncé, pied souvent recouvert par les tubes, sur conifère. Tubes décurrents en labyrinthe
Pholiota	tuberculosa		Pholiote tuberculeuse	Chair jaune à rougeâtre vers la base, odeur de chocolat en vieillissant, saveur amère, sur branches de feuillus
Piptoporus	betulinus	Fomitopsis betulina	Polypore du bouleau	Charnu, coriace, brun grisâtre à café au lait, pores fins, sur bouleaux morts ou vivants
Pleurotus	ostreatus		Pleurote en huitre	Gris bleuâtre à ardoisé, lignicole
Pluteus	cervinus		Plutée couleur de cerf	Finement fibrilleux-soyeux au bord, pied crème avec des fibrilles brunes vers la base, odeur forte de radis, sur bois mort
Polyporus	squamosus	Cerioporus squamosus	Polypore squameux	Pores larges, chapeau écailleux
Psathyrella	multipedata	Britzelmayria multipedata	Psathyrelle cespiteuse	Touffe d'individus connés à la base
Psilocybe	squamosa	Stropharia squamosa, Leratiomyces squamosus	Psilocybe écailleux	Squames marginales blanches
Ramaria	formosa		Clavaire élégante	Chair vineuse. Pointes jaunes (jeune)
Rickenella	fibula		Omphale bibelot	Petite omphale orange
Russula	atropurpurea	Russula krombholzii	Russule noire et pourpre	Violet +/- sombre, pied taché d'ocre ou de rouille à la base, saveur légèrement piquante, odeur de pomme fraîche, fer rose orangé sale
Russula	aurora	Russula rosea, velutipes	Russule rose	Rose à stipe farineux au sommet, lames blanches, gaïac presque nul sur le pied, bleu sur les lames
Russula	chloroides		Russule verdâtre	Lames très serrées à reflets verdâtres, nettement décurrentes, odeur fruitée forte, fer rougeâtre, gaïac rapide et intense
Russula	delica		Russule sans lait	Chapeau beige sale. Chair douce. Lames blanches peu serrées, odeur fruitée ou de poisson, fer rose pâle, gaïac rapide et intense
Russula	densifolia		Russule à lames serrées	Lames très serrées un peu âcres, odeur de vieux tonneau, chair rougissant puis noircissant
Russula	fageticola	Russula mairei, Russula nobilis	Russule émétique du hêtre	Rouge, sous hêtre, chair rouge sous cuticule
Russula	graveolens		Russule malodorante	Brun-pourpre-olivâtre, odeur de crustacé, surtout sous chênes
Russula	heterophylla		Russule verte	Vert bronzé, lames fourchues et interveinées près du pied, pied se tachant de rouille, fer rose orangé très vif
Russula	integra		Russula intègre	Brun à brun-jaune, lames fourchues, un peu interveinées, saveur de noisette, odeur faible, conifères montagne
Russula	lepida	Russula rosea	Russule jolie	Mat, rouge-rose assez vif, chair très ferme, odeur et goût mentholés, pied (pas toujours teinté de rose) très ferme

Russula	luteotacta		Russule jaune au toucher	Rouge sang souvent décolorée en crème, lames jaunissant aux endroits meurtris, exsudant parfois quelques goutte laiteuses, odeur un peu fruitée ou miellée, saveur très piquante
Russula	nigricans	Russula adusta	Russule noircissante	Blanc puis rapidement brun noirâtre, chair rougissant avant de noircir
Russula	olivacea		Russule olivacée	Brun olivâtre à pourpre ou verdâtre, lames jaunes, haut du stipe rose, réaction rouge cassis au phénol.
Scleroderma	areolatum		Scléroderme aréolé	Intérieur gris-noir, verrues plates polygonales aréolées brun-rougeâtre sur fond jaunâtre, base courtement stipitée
Stereum	hirsutum		Stérée hirsute	Hyménium lisse-Chapeaux imbriqués hirsutes ou veloutés
Stropharia	caerulea	Stropharia cyanea	Strophaire vert de gris	Visqueux, vert bleuté - Lames gris-violacé à arête concolore
Stropharia	coronilla	Psilocybe coronilla	Strophaire coronille	Jaune ochracé, lames lilacines à arêtes pâles, stipe blanc à anneau membraneux et strié, prés et dunes
Stropharia	semiglobata	Protostropharia semiglobata	Strophaire semi globulaire	Semi-sphérique. Anneau médian, membraneux, chair à odeur farineuse, sur bouses ou crottins
Tapinella	atrotomentosa	Paxillus atrotomentosus	Paxille à pied noir	Brun à brun-roux, velouté-feutré, lames fortement décurrentes, anastomosées vers le pied, pied +/- excentré couvert d'un velours brun sombre à noirâtre, sur bois mort de conifère
Trametes	gibbosa		Tramète bossue	Surface bosselée souvent verdie par les algues, pores allongés radialement
Trametes	versicolor	Coriolis versicolor	Tramète versicolore	Chapeaux imbriqués, plats et minces, zones concentriques de couleurs très variées
Tricholoma	inocybeoides	Tricholoma argyraceum		Chapeau fibrilleux nettement mamelonné - gris à ochracé - odeur et saveur farineus - sous bouleaux ou peupliers
Tricholoma	sculpturatum		Tricholome jaunissant	Feutré-laineux, bord et lames jaunissant, odeur et saveur farineuses, sous feuillus
Tricholoma	sejunctum		Tricholome disjoint	Vert, bronze, jaunâtre. saveur farineuse amère.
Tricholoma	sulphureum		Tricholome soufré	Jaune, lames espacées jaune vif, odeur de gaz d'éclairage (soufrée), saveur farineuse écoeurante
Vascellum	pratense	Lycoperdon pratense	Vesse de loup des prés	Boule molle (maxi 6cm) brun crème recouverte d'aiguillons caducs, pied trapu, pelouses et prairies. Diaphragme séparant la subgléba
Xerocomus	badius	Boletus badius, Imleria badia	Bolet bai	Bolet brun-bai (tubes verdissant au toucher)
Xerocomus	chrysenteron	Xerocomellus chrysenteron	Bolet à chair jaune	De couleurs variables, se craquelant vite en tous sens, rose sous la cuticule, chair bleuissant très légèrement
Xerocomus	pruinatus	Xerocomellus pruinatus	Bolet pruineux	Brun noirâtre, se craquelant vite en tous sens, rose sous la cuticule, chair bleuissant très légèrement
Xerocomus	subtomentosus		Bolet subtomenteux	Pores jaune-vif puis jaune olivâtre, chair rosée dans la base du pied
Xerula	radicata	Oudemansiella radicata, Hymenopellis radicata	Collybie radicante	Beige à brun foncé, "racine" aussi longue que le stipe

UN GRAND MERCI

A L'EQUIPE DE DOMINIQUE

AUX "CROQUEURS DE POMMES"

*AUX MEMBRES DE LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU SEDANAIS QUI ONT PARTICIPE OU
VISITE L'EXPOSITION*

Les travaux d'installation pour l'exposition mycologique



Les travaux d'installation pour les "croqueurs de pommes"



Les espèces identifiées sont en cours de mise en place



Les "Croqueurs de pommes" s'activent également



Et Dominique s'affaire à sa présentation de baies et fruits divers



L'exposition prend forme



De nombreuses espèces de pommes sont présentées



Joli travail de Dominique



avec des compositions de fruits et champignons



Environ 250 personnes ont visité l'exposition



Et c'est le démontage le dimanche en fin d'après-midi



Rendez-vous à ***RAUCOURT*** le samedi 22 octobre à 14 heures
pour une sortie
dans le Bois de Raucourt ou au Grand Dieulet
en fonction du plan de chasse