

[Retour](#)

Photos en fin de liste

Lieu : Pure

Conditions climatiques : Ensoleillé - La pluie est là ...

Personnes présentes : 4, tous membres de la SMS

23 Espèces identifiées

| <i>Noms scientifiques utilisés</i> | | <i>Autres noms</i> | <i>Nom français</i> | <i>Commentaires</i> |
|------------------------------------|-------------|--|---------------------------|---|
| Boletus | edulis | | Cèpe de Bordeaux | Brun +/- sombre, marge plus claire, réseau concolore sur le haut du stipe |
| Calocera | cornea | | Calocère cornée | Petit, jaune, sur bois |
| Clitocybe | gibba | Clitocybe infundibuliformis - Infundibulicybe gibba | Clitocybe en entonnoir | Mamelonné puis déprimé, lames très décurrentes |
| Collybia | dryophila | Gymnopus dryophilus | Collybie des arbres | Collybie des feuilles |
| Crepidotus | variabilis | | Crépidote variable | Souvent attaché "par le dos" |
| Daedaleopsis | confragosa | Trametes rubescens | Tramète rude | Pores très allongés |
| Fomes | fomentarius | | Amadouvier | En forme de sabot, très épais, pores fins, chair à consistance de liège, saveur un peu amère. |
| Lenzites | betulina | | Lenzite du bouleau | Pores allongés, lamelliformes. Sur bouleau |
| Lycogala | epidendrum | | Lait de loup | Carpophores mous globuleux roses puis brunâtres |
| Lycoperdon | perlatum | | Vesse de loup perlée | Boule molle blanche avec de fins aiguillons coniques à base ronde, petit mamelon brun ensuite percé d'un petit trou rond, pas de diaphragme, sur le sol |
| Marasmiellus | ramealis | | Marasme des rameaux | Marasme des brindilles |
| Marasmius | alliaceus | Mycetinis alliaceus | Marasme à odeur d'ail | Pied noir tenace - Odeur forte d'ail |
| Marasmius | rotula | | Marasme petite roue | Présence d'un collarium |
| Meripilus | giganteus | | Polypore géant | Pores fins et noircissant |
| Piptoporus | betulinus | Fomitopsis betulina | Polypore du bouleau | Charnu, coriace, brun grisâtre à café au lait, pores fins, sur bouleaux morts ou vivants |

| Noms scientifiques utilisés | | Autres noms | Nom français | Commentaires |
|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|
| Pluteus | cervinus | | Plutée couleur de cerf | Finement fibrilleux-soyeux au bord, pied crème avec des fibrilles brunes vers la base, odeur forte de radis, sur bois mort |
| Polyporus | leptocephalus | Polyporus varius | Polypore variable | Pied souvent excentré et à base noire |
| Russula | vesca | | Russule comestible | Couleur "jambon", cuticule courte (elle montre ses dents), lames interveinées vers le pied |
| Russula | violeipes | | Russule à pied violet | Chapeau rouge pourpre et pied évasé sous le chapeau, violacé parfois blanc, odeur d'artichaut |
| Stereum | hirsutum | | Stérée hirsute | Hyménium lisse-Chapeaux imbriqués hirsutes ou veloutés |
| Trametes | hirsuta | | Tramère hirsute | Chapeaux imbriqués, plats et minces. Poilus |
| Trametes | versicolor | Coriolis versicolor | Tramète versicolore | Chapeaux imbriqués, plats et minces, zones concentriques de couleurs très variées |
| Xylaria | polymorpha | | Xylaire polymorphe | Carpophores noirs charnus, en masse irrégulière, en touffes, une coupe permet de voir les petites loges noires des spores (périthèces) |

Merci aux membres présents pour leurs photographies

Photo de départ prise par notre Président



Photo de départ prise par votre Secrétaire



ça commence mal, je ne connais pas



Celui-ci, avec un peu de réflexion, ça va aller



Et celui-ci, il n'est pas grand, on le prend quand même ?



On renifle !!!



ça c'est facile ! ?



Les découvertes du chef



Une petite collation ... merci Guy



Nos découvertes



Quelques espèces en photos

Meripilus giganteus
Polypore géant



Le pluté coloré de cerf
Pluteus cervinus



Russula vesca
Russule comestible



Russula violeipes
Russule à pied violet



Boletus edulis
Cèpe de Bordeaux



Rendez-vous à la salle des fêtes de Grand Faily Le 24 septembre à 13h30
pour une sortie
dans les bois à proximité de Grand Faily

Infos sur le site